




# من أجل بداية حسنة

إعداد: الأستاذ ك. حامدي



## في هذا المحور

- 1.....الدرجة الثانية.
- 3.....عموميات على الدوال
- 5.....قواعد الحساب على المتباينات
- 6.....تطبيقات.



## الدرجة الثانية

## الشكل النموذجي

ليكن كثير الحدود من الدرجة الثانية:  $p(x) = ax^2 + bx + c$  مع  $a \neq 0$   
الشكل النموذجي لـ  $p(x)$  هو:

$$p(x) = a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] \square$$

نضع  $\Delta = b^2 - 4ac$  ونسميه مُميّز كثير الحدود  $p(x)$

## تمرين محلول 1 تعيين الشكل النموذجي

عين الشكل النموذجي لكثير الحدود:

$$1. \quad p(x) = 2x^2 + 3x - 14$$

$$2. \quad p(x) = -3x^2 + 4x - 1$$

## الحل

$$p(x) = 2x^2 + 3x - 14 = 2 \left( x^2 + \frac{3}{2}x - 7 \right) = 2 \left[ \left( x + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{9}{16} - 7 \right] = 2 \left[ \left( x + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{121}{16} \right] \square$$

ملاحظة

$$x^2 \pm bx = \left( x \pm \frac{b}{2} \right)^2 - \frac{b^2}{4}$$

## جذور كثير الحدود من الدرجة الثانية

حلول المعادلة  $p(x) = 0$  (أو جذور كثير الحدود  $p(x)$ ) مرتبطة بإشارة المميز  $\Delta = b^2 - 4ac$

- إذا كان  $\Delta < 0$  فإن المعادلة ليس لها حل
- إذا كان  $\Delta = 0$  فإن للمعادلة حلاً مضاعفاً هو  $x = -\frac{b}{2a}$
- إذا كان  $\Delta > 0$  فإن للمعادلة حلين متمايزين هما:  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  و  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

**تمرين محلول 2 حل معادلة من الدرجة الثانية**

حل المعادلات من الدرجة الثانية التالية :

(ج)  $x^2 - 5x + 6 = 0$

(ب)  $3x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{49}{48} = 0$

(ف)  $2x^2 + 5x - 7 = 0$

**الحل**لحل المعادلة  $2x^2 + 5x - 7 = 0$  نحسب المميز  $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-7) = 25 + 56 = 81 = 9^2$ 

للمعادلة حلين متميزين هما :

$$x_2 = \frac{-5+9}{4} = 1 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-5-9}{4} = -\frac{7}{2}$$

**التحليل، مجموع و جداء الجذرين**تحليل كثير الحدود  $p(x) = ax^2 + bx + c$  مرتبط بإشارة المميز  $\Delta$ 

- إذا كان  $\Delta > 0$  فإن لـ  $p(x)$  جذرين متميزين  $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$  و  $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$  و :  $p(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$
- وإذا كان  $S$  هو مجموع الجذرين و  $P$  هو جداؤهما فإن :  $S = -\frac{b}{a}$  و  $P = \frac{c}{a}$
- إذا كان  $\Delta = 0$  فإن لـ  $p(x)$  جذراً مضاعفاً  $x_0 = -\frac{b}{2a}$  و  $p(x) = a(x-x_0)^2$
- إذا كان  $\Delta < 0$  فإن  $p(x)$  لا يقبل جذور و لا يمكن تحليله

**ملاحظة**

إذا كان  $x_1$  جذراً واضحاً لـ  $p(x)$  فإن الجذر الآخر هو  $x_2 = \frac{P}{x_1}$

**تمرين محلول 3 تحليل ثلاثي الحد**حل كثيرا الحدود :  $p(x) = 2x^2 + 5x - 7$  و  $q(x) = 2x^2 + 3x - 14$ **الحل** $x_1 = 1$  هو جذر واضح لـ  $p(x)$  لأن  $2 \times 1^2 + 5 \times 1 - 7 = 0$ ، و جداء الجذرين هو  $P = -\frac{7}{2}$ . إذن  $x_2 = \frac{P}{x_1} = -\frac{7}{2}$  و عليه :

$$p(x) = 2(x-1)\left(x+\frac{7}{2}\right) = (x-1)(2x+7)$$

**إشارة كثير الحدود من الدرجة الثانية** $p(x) = ax^2 + bx + c$  كثير حدود من الدرجة الثانية و  $\Delta = b^2 - 4ac$  هو مميزه

- إذا كان  $\Delta < 0$  فإن إشارة  $p(x)$  هي دوما إشارة  $a$
- إذا كان  $\Delta = 0$  فإن إشارة  $p(x)$  هي دوما إشارة  $a$  ( باستثناء إذا كان  $x = -\frac{b}{2a}$  لأن في هذه الحالة  $p(x) = 0$  )
- إذا كان  $\Delta > 0$  فإن إشارة  $p(x)$  هي إشارة  $a$  باستثناء قيم  $x$  المحصورة بين الحلين لأن في هذه الحالة إشارة  $p(x)$  هي عكس إشارة  $a$

**تمرين محلول 4 حل متراجحات من الدرجة الثانية**

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية، المتراجحات :

(ج)  $4x^2 - 12x + 9 \leq 0$

(ب)  $2x^2 + 3x - 14 > 0$

(ف)  $2x^2 + 5x - 7 \leq 0$

**الحل**حل المتراجحة  $2x^2 + 5x - 7 \leq 0$  : حسبنا الجذرين  $x_1 = 1$  و  $x_2 = -\frac{7}{2}$ . الجدول التالي يُعطينا إشارة  $2x^2 + 5x - 7$  :

$x$	$-\infty$	$-\frac{7}{2}$	$1$	$+\infty$
$2x^2 + 5x - 7$		+	-	+


و عليه فإن مجموعة حلول المتراجحة  $2x^2 + 5x - 7 \leq 0$  هي  $S = \left[-\frac{7}{2}; 1\right]$

## اتجاه التغير و التمثيل البياني

لتكن الدالة  $p$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $p(x) = ax^2 + bx + c$  حيث  $a, b, c$  أعداد حقيقية مع  $a \neq 0$


إذا كان  $a < 0$

$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$p(x)$	$-\infty$	$-\frac{\Delta}{4a}$	$-\infty$



إذا كان  $a > 0$

$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$p(x)$	$+\infty$	$-\frac{\Delta}{4a}$	$+\infty$



## عموميات على الدوال

### شفعية الدالة

لتكن  $f$  الدالة المعرفة على المجموعة  $\mathcal{D}_f$  المتناظرة بالنسبة إلى 0 وليكن  $\mathcal{C}_f$  تمثيلها البياني

- نقول أن الدالة  $f$  زوجية معناه أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x \in \mathcal{D}_f$  لدينا  $f(-x) = f(x)$  وفي هذه الحالة وفي معلم متعامد المنحني  $\mathcal{C}_f$  متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب
- نقول أن الدالة  $f$  فردية معناه أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x \in \mathcal{D}_f$  لدينا  $f(-x) = -f(x)$  وفي هذه الحالة المنحني  $\mathcal{C}_f$  متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم

تفذية

الدالة مربع  $x^2 \mapsto x$  زوجية  
و الدالة مقلوب  $\frac{1}{x} \mapsto x$   
فردية

### اتجاه التغير

$f$  هي دالة معرفة على مجال  $I$  من  $\mathbb{R}$

- القول أن الدالة  $f$  متزايدة تماماً على  $I$  معناه أنه من أجل كل عددين  $a$  و  $b$  من  $I$  إذا كان  $a < b$  فإن  $f(a) < f(b)$
- القول أن الدالة  $f$  متناقصة تماماً على  $I$  معناه أنه من أجل كل عددين  $a$  و  $b$  من  $I$  إذا كان  $a < b$  فإن  $f(a) > f(b)$

تفذية


الدالة المتزايدة تحافظ على الترتيب و الدالة المتناقصة تعكس الترتيب

### الحل البياني

$\mathcal{C}_f$  هو التمثيل البياني لدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى معلم  $(\vec{i}; \vec{j})$ . بيانياً:

- حلول المعادلة  $f(x) = 0$ ، هي فواصل نقط تقاطع المنحني  $\mathcal{C}_f$  مع حامل محور الفواصل
- حلول المتراجحة  $f(x) < 0$  هي فواصل نقط المنحني  $\mathcal{C}_f$  الواقعة تحت محور الفواصل
- حلول المتراجحة  $f(x) > 0$  هي فواصل نقط المنحني  $\mathcal{C}_f$  الواقعة فوق محور الفواصل

## تمرين محلولة 5 الحل البياني لمعادلات و متراجحات



المنحني (C) يُمثل دالة  $f$  و المنحني (T) يُمثل دالة تآلفية  $g$ ، الدالتين معرفتين على  $\mathbb{R}$ . حل بيانياً :

(أ) المعادلتين  $f(x) = 0$  و  $g(x) = 0$  (ب) المتراجحة  $f(x) > 0$  (ج) المتراجحة  $f(x) > g(x)$

## اتجاه تغيّر دوال مرفقة

$\lambda$  عدد حقيقي،  $f$  و  $g$  دالتان معرفتان على مجال  $I$

- مجموع الدالتين متزايدتين تماماً على مجال  $I$  هو دالة متزايدة تماماً على  $I$
- مجموع الدالتين متناقصتين تماماً على مجال  $I$  هو دالة متناقصة تماماً على  $I$
- إذا كان  $\lambda > 0$ ، فإن  $f$  و  $\lambda f$  لهما نفس اتجاه التغيّر على المجال  $I$
- إذا كان  $\lambda < 0$ ، فإن  $f$  و  $\lambda f$  لهما اتجاهها تغيّر متعاكسان على المجال  $I$
- إذا كانت  $f$  موجبة على  $I$  فإن  $f$  و  $\sqrt{f}$  لهما نفس اتجاه التغيّر
- إذا كانت  $f$  غير معدومة على  $I$  فإن  $f$  و  $\frac{1}{f}$  لهما اتجاهها تغيّر متعاكسان

## تمرين محلولة 6 دراسة اتجاه تغيّر دوال

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة  $f: x \mapsto \sqrt{1-x}$  على المجال  $] -\infty; 1 ]$
2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة  $g: x \mapsto \frac{1}{2-x}$  على المجال  $] 2; +\infty [$

## الحل

بالنسبة إلى  $f$ ، نضع  $u(x) = 1 - x$

الدالة  $u$  معرفة على المجال  $] -\infty; 1 ]$  و هي تآلفية معامل توجيهها  $-1$  فهي إذن متناقصة على المجال  $] -\infty; 1 ]$

ومنه الدالة  $f$  متناقصة على المجال  $] -\infty; 1 ]$

## قواعد الحساب على المتباينات

## العمليات على المتباينات

- من أجل كل عدد حقيقي  $a$ ،  $x < y \Leftrightarrow x + a < y + a$
- من أجل كل عدد  $k > 0$ ،  $x < y \Leftrightarrow kx < ky$
- من أجل كل عدد  $k < 0$ ،  $x < y \Leftrightarrow kx > ky$
- من أجل  $x$  و  $y$  من نفس الإشارة،  $x < y \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$
- من أجل كل  $x$  و  $y$  موجبان تماماً،  $x < y \Leftrightarrow x^2 < y^2$
- من أجل كل  $x$  و  $y$  سالبان تماماً،  $x < y \Leftrightarrow x^2 > y^2$
- من أجل كل  $x$  و  $y$  موجبان تماماً،  $x < y \Leftrightarrow \sqrt{x} < \sqrt{y}$
- إذا كانت  $f$  متزايدة على مجال  $I$ ،  $x < y \Leftrightarrow f(x) < f(y)$
- إذا كانت  $f$  متناقصة على مجال  $I$ ،  $x < y \Leftrightarrow f(x) > f(y)$
- يُمكن أن نجمع طرفاً بطرف متباينتين من نفس الاتجاه
- يُمكن أن نضرب طرفي متباينتين من نفس الاتجاه، طرفاً بطرف، عندما يتعلق الأمر بأعداد موجبة
- لا يمكن طرح أو قسمة طرفاً بطرف متباينتين

تنبيه

المتباينة لا تتغير بضرب طرفيها بعدد موجب تماماً

تنبيه

ترتيب مربعي عددين موجبين هو نفس ترتيب هذين العددين

## تمرين محلول 7 استعمال خواص المتباينات

1. علماً أنّ  $3 < x < 5$ ، ما يُمكن استنتاجه بالنسبة إلى  $\frac{1}{3-x}$
2. أثبت أنه من أجل  $x > 1$ ، فإن  $\frac{1}{x} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

## الحل

1. من أجل  $3 < x < 5$  فإن  $-5 < -x < -3$  وبإضافة 3 إلى أطراف الحصر نحصل على  $-2 < 3 - x < 0$
- الدالة مقلوب متناقصة تماماً على المجال  $]-\infty; 0[$  إذن:  $\frac{1}{3-x} < -\frac{1}{2}$
2. من أجل كل  $x > 1$ :  $x^2 - 1 < x^2$  و عليه  $\sqrt{x^2 - 1} < \sqrt{x^2}$  أي:  $\sqrt{x^2 - 1} < x$  ثم:  $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} > \frac{1}{x}$

## تمرين محلول 8 حصر فرق و حاصل قسمة عددين

1. علماً أنّ:  $\begin{cases} -2 < x < 3 \\ -4 < y < -1 \end{cases}$  عيّن حصرًا للعدد  $x - y$
2. علماً أنّ:  $\begin{cases} 8 < x < 9 \\ 3 < y < 4 \end{cases}$  عيّن حصرًا للعدد  $\frac{x}{y}$
3. علماً أنّ:  $\begin{cases} -2 < x < -1 \\ 2 < y < 3 \end{cases}$  عيّن حصرًا للعدد  $\frac{x}{y}$
4. علماً أنّ:  $\begin{cases} 2 < x < 3 \\ -1 < y < 1 \end{cases}$  عيّن حصرًا للعدد  $xy$

تنبيه

لحصر  $x - y$ ، نقوم أولاً بحصر  $-y$  ثم نجمع طرفاً بطرف مع حصر  $x$ 

## الحل

1. من الجملة  $\begin{cases} -2 < x < 3 \\ -4 < y < -1 \end{cases}$  نستنتج  $\begin{cases} -2 < x < 3 \\ 1 < -y < 4 \end{cases}$  ومنه  $-1 < x - y < 7$

## تطبيقات

## المعادلات

01 معادلات من الدرجة الثانية. حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية

1.  $2x^2 - 3x - 5 = 0$

2.  $(x-2)(x+3) = (x-2)(4x+1)$

02 معادلات بتغيير للمتغير. حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية

1.  $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$

2.  $x - 3\sqrt{x} - 4 = 0$

03 معادلات ناطقة. حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية

1.  $\frac{x^2-x}{x-1} = 2x+3$

2.  $\frac{1}{x} = \frac{1}{x^2}$

04 معادلات صماء. حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية

1.  $\sqrt{x} = x - 2$

2.  $\sqrt{x-3} = -x + 5$

05 معادلات بحلول واضحة

1. نعتبر المعادلة (E):

$2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = 0$

(أ) أثبت أن العدد 1 هو حلاً للمعادلة (E)

(ب) عين الأعداد الحقيقية  $a$ ,  $b$  و  $c$  بحيث يكون:

$2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

(ج) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة (E)2. بعد تعيين حلاً واضحاً، حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية

(أ)  $6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = 0$

(ب)  $x^3 - x^2 - 4x - 6 = 0$

(ج)  $x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 8x + 4 = 0$

## المتراجحات

06 حل متراجحة من الدرجة الثانية

نعتبر ثلاثي الحدود  $f(x) = -5x^2 - 4x + 1$ 1. عين جذور  $f(x)$ .2. شكل جدول إشارة  $f(x)$  مع التبهرير.3. حل في  $\mathbb{R}$  المتراجحة  $f(x) \leq 0$ 

07 حل متراجحة ناطقة

نعتبر في  $\mathbb{R} - \{-1; 2\}$  المتراجحة (1):

$$\frac{-2x}{x+1} \geq \frac{4x+3}{x-2}$$

1. أثبت أن المتراجحة (1) تكافئ:

$$\frac{-6x^2 - 3x - 3}{(x+1)(x-2)} \geq 0$$

2. نضع

$$C(x) = \frac{-6x^2 - 3x - 3}{(x+1)(x-2)}$$

(أ) أدرس إشارة كل من

$-6x^2 - 3x - 3$  و  $(x+1)(x-2)$

(ب) شكل جدولاً توضح فيه إشارة  $C(x)$ 

3. استنتج حلول المتراجحة (1)

08 حل متراجحة صماء. حل في  $\mathbb{R}$  المتراجحات التالية

1.  $2 - x < \sqrt{-x+4}$

2.  $2x + 5 > \sqrt{x-2}$

3.  $x + 1 \leq \sqrt{x^2 - 3x - 4}$

## النتائج

رقم التمرين النتائج

01 1.  $S_1 = \left\{-1; \frac{5}{2}\right\}$

2.  $S_2 = \left\{\frac{2}{3}; 2\right\}$

02 1.  $S_1 = \{-2; -\sqrt{3}; \sqrt{3}; 2\}$

2.  $S_2 = \{16\}$

03 1.  $S_1 = \{-3\}$

2.  $S_2 = \{1\}$

04 1.  $S_1 = \{4\}$

2.  $S_2 = \{4\}$

05 1. (ب)  $(a; b; c) = (2; -11; -6)$

(ج)  $S_1 = \left\{-\frac{1}{2}; 1; 6\right\}$

2. (أ)  $S_2 = \left\{-\frac{5}{2}; ?; \frac{1}{3}\right\}$

(ب)  $S_3 = \{3\}$

(ج)  $S_4 = \{-1 - \sqrt{2}; -2; -1 + \sqrt{2}; ?\}$

06 1.  $\left\{-1; \frac{1}{5}\right\}$

3.  $]-\infty; -1] \cup \left[\frac{1}{5}; +\infty[$

07 3.  $]-\infty; -1[ \cup ]2; +\infty[$

08 1.  $]0; 4]$

2.  $[2; +\infty[$

3.  $]-\infty; -1]$